



Marco O. Bertelli

SPAIIDD-G

**Systematic Psychopathological
Assessment for persons
with Intellectual and Developmental
Disabilities - General screening**

Valutazione psicopatologica sistematica
per le persone con disabilità intellettiva
o dello sviluppo - screening generale

Rapporto interpretativo



SPAIDD-G

Systematic Psychopathological Assessment for persons with Intellectual and
Developmental Disabilities - General screening

Marco O. Bertelli

RAPPORTO INTERPRETATIVO

Nominativo:

Codice questionario:

4P8LLK68

Data della prova:

17/12/2019

Codice cliente:

SPAIDD-G

Nome e cognome:

Loredana

Genere:

Femminile

Età:

18

Area di residenza in Italia:

Centro

Relazione dell'informatore con il soggetto:

Altro

Qualifica dell'intervistatore:

Psichiatra

Disturbo del neurosviluppo:

Disturbo dello spettro autistico

Introduzione

Il *Systematic Psychopathological Assessment for persons with Intellectual and Developmental Disabilities - General screening (SPAIDD-G)* è uno strumento di supporto alla valutazione psicopatologica delle persone con disabilità intellettiva e/o disturbo dello spettro autistico in cui siano presenti difficoltà di comunicazione e di concettualizzazione della sofferenza psichica.

Lo strumento è rivolto principalmente ai clinici, ma è utilizzabile anche da tutte le altre professionalità che operano nel settore, sia individualmente che in squadra. Facile da usare, permette di individuare le aree di psicopatologia a maggior rilevanza clinica, sulla base della presenza o assenza di comportamenti e altri aspetti espressivi osservabili, corrispondenti a 56 sintomi psichiatrici chiave.

Il seguente rapporto presenterà i risultati del calcolo automatizzato della rilevanza clinica dei 18 raggruppamenti meta-sindromici che compongono lo strumento. Sono da considerarsi rilevanti i raggruppamenti con un punteggio uguale o superiore a 50.

Per i raggruppamenti a maggiore rilevanza clinica (fino a un massimo di 5) verrà fornita un'analisi dei relativi equivalenti comportamentali con risposta affermativa in modo da aiutare il clinico nel giudizio diagnostico generale. Ognuno di questi equivalenti viene definito da tre fattori: Peso sindromico relativo (P), Specificità sindromica (S) e Rilevanza sindromica (R).

Per informazioni sul significato di questi fattori e per approfondimenti sull'interpretazione dei risultati dello strumento si faccia riferimento al capitolo 4 del manuale.

Utilizzo del rapporto

Le decisioni basate sul rapporto dei risultati del test SPAIDD-G devono essere prese con il supporto di professionisti qualificati.


Qualsiasi testo contenuto in un rapporto computerizzato va infatti visto come un'ipotesi che deve essere confermata da altre fonti di informazione, come colloqui, dati biografici o esiti di altre valutazioni.

Le condizioni sindromiche rilevate dallo strumento possono riferirsi sia al periodo attuale che al passato. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del rapporto dei risultati del test SPAIDD-G si faccia riferimento al manuale del test.

Il contenuto di questo rapporto è riservato e deve essere trattato in modo assolutamente confidenziale e rispettoso della riservatezza della persona cui si riferisce.

Punteggi dei raggruppamenti sindromici e meta-sindromici

RAGGRUPPAMENTI SINDROMICI E META-SINDROMICI		PUNTEGGIO
DNA	Disturbi nutrizione/alimentazione	43
D. PSICOT	Disturbi psicotici	55
DEPRES	Disturbo dell'umore - depressione	59
MANIA	Disturbo dell'umore - mania	40
D. D'ANSIA	Disturbi d'ansia	72
E.I. FARM	Effetti indesiderati di farmaci	38
DELIRIUM	Delirium	41
DEMEN	Demenza	38
SOST	Disturbi correlati a sostanze	54
D.P. ECC	Disturbo di personalità eccentrica	70
D.P. DRAM	Disturbo di personalità drammatica	50
D.P. ANS	Disturbo di personalità ansiosa	83
DCI	Disturbo del controllo degli impulsi	71
DSA	Disturbo dello spettro autistico	80
D. IDENT	Dissociazione dell'identità	50
DSS	Disturbo da sintomi somatici	67
D. SEX	Disturbo della sessualità	0
DOC	Disturbo ossessivo-compulsivo	80
TOT	Totale SPAIDD-G	50



Analisi dei raggruppamenti sindromici e meta-sindromici

Disturbo di personalità ansiosa

Peso sindromico relativo (P): 17		
Equivalente comportamentale	Specificità sindromica (S)	Rilevanza clinica (R)
Evitamento	72	A
Riduzione dell'interazione sociale	72	A
Ansia	50	B
Ritiro in casa	83	B
Appiattimento affettivo	72	C

È caratterizzato da comportamenti ansiosi o inibiti. Alcune persone con un disturbo di personalità di questo gruppo sono eccessivamente sensibili al rifiuto e pertanto restie a instaurare nuovi rapporti o a esporsi a qualunque nuova attività. Presentano un forte desiderio di affetto e accettazione, ma evitano i rapporti intimi e le situazioni sociali per timore di apparire inadeguati o di essere criticati. Altre persone presentano una bassa stima di sé, appaiono molto insicure e si affidano completamente agli altri nelle decisioni e nelle responsabilità, fino a consentire loro di prevaricare i propri bisogni. Altre persone ancora appaiono eccessivamente ordinate e metodiche, ma la loro inflessibilità le rende incapaci di adattarsi ai cambiamenti e di completare le attività intraprese.

Quando riferita principalmente agli aspetti evitanti e dipendenti di personalità, la positività del test a questa categoria diagnostica deve essere accolta con riserva, viste le grandi difficoltà a differenziare dalle disabilità di base.

Disturbo ossessivo-compulsivo

Peso sindromico relativo (P): 20		
Equivalente comportamentale	Specificità sindromica (S)	Rilevanza clinica (R)
Blocco ossessivo	100	A+
Ansia	50	B
Evitamento	72	B
Ripetitività	78	C

Come indicato dal nome questo disturbo è caratterizzato dalla presenza di ossessioni e compulsioni. Le ossessioni sono pensieri o impulsi intrusivi e ricorrenti, che generano forte ansia. Le compulsioni sono comportamenti ripetitivi che, secondo la persona che le agisce, permettono di alleviare momentaneamente il disagio e l'ansia provocati dalle ossessioni. Le ossessioni sono spesso difficili da concettualizzare e da comunicare e il disturbo si manifesta soprattutto con comportamenti compulsivi. Fra i più frequenti si elencano il riordino o l'allineamento d'oggetti, il riempimento e lo svuotamento di contenitori, lo sfregamento di una parte del corpo, la ripetizione di domande, parole o fonazioni. L'impedimento nell'attuazione delle compulsioni determina spesso aggressività.

Disturbo dello spettro autistico

Peso sindromico relativo (P): 20		
Equivalente comportamentale	Specificità sindromica (S)	Rilevanza clinica (R)
Alterazione della comunicazione	72	A
Ripetitività	78	A
Difetto empatico	78	A
Riduzione dell'interazione sociale	72	A

Rappresenta una sindrome complessa con insorgenza nell'età dello sviluppo, tipicamente prima della scolarizzazione. Si caratterizza per importanti difficoltà nell'interazione sociale, nella comunicazione, nella gamma e nell'intensità degli interessi. Le persone con questo disturbo hanno difficoltà a esternare i propri sentimenti e a leggere quelli degli altri, a immaginare cose di cui non hanno fatto esperienza, tendono all'isolamento, non comunicano, mostrano un linguaggio limitato o non adeguato al contesto e svolgono attività ripetitive. In alcuni casi hanno anche una sensibilità particolare agli stimoli ambientali.

Le manifestazioni del disturbo sono molto varie, le forme più gravi sono spesso associate a disabilità intellettiva.

Disturbi d'ansia

Peso sindromico relativo (P): 6		
Equivalente comportamentale	Specificità sindromica (S)	Rilevanza clinica (R)
Ansia	50	A
Evitamento	72	A
Anedonia	78	B
Depersonalizzazione/derealizzazione	83	B
Insonnia	72	B
Riduzione dell'interazione sociale	72	B
Ritiro in casa	83	B
Aggressività eterodiretta	50	C
Alterazione della comunicazione	72	C
Ripetitività	78	C
Distraibilità	67	C
Irritabilità	67	C
Difetto ponderale	78	C

In questi disturbi, l'ansia – emozione caratterizzata da sensazioni di tensione, minaccia, preoccupazioni e modificazioni fisiche – raggiunge livelli tali da alterare i comportamenti e le capacità personali.

Solitamente l'ansia si associa a pensieri e preoccupazioni ricorrenti, che possono portare a evitare alcune situazioni. Sintomi frequenti sono irritabilità, comportamenti aggressivi o autolesivi, stereotipie (se già presenti, intensificazione) o altri comportamenti ripetitivi, crisi di pianto, oppositività, bisogno di rassicurazione, disturbi del sonno, agitazione psicomotoria, umore basso, pseudo-convulsioni, variazioni dell'appetito e disturbi fisici di vario tipo, come battito cardiaco accelerato, arrossire, vertigini, mal di testa, sudorazione, formicolio e intorpidimento, senso di soffocamento, bocca secca (la persona chiede ripetutamente di bere), dolori di stomaco, nausea, vomito e diarrea, necessità di andare in bagno più del solito, dolori muscolari (soprattutto del collo, spalle e schiena), irrequietezza, tremori o dolore toracico.

Disturbo del controllo degli impulsi

Peso sindromico relativo (P): 14		
Equivalente comportamentale	Specificità sindromica (S)	Rilevanza clinica (R)
Aggressività eterodiretta	50	A
Autolesionismo	72	C
Distraibilità	67	C
Irritabilità	67	C
Inappagabilità	83	C

In questo disturbo determinati stimoli o stati affettivi inducono impulsi che la persona non controlla e che provocano comportamenti dannosi per se stessa o per gli altri. Più spesso si tratta di aggressività e di sottrazione di oggetti. Il discontrollo si associa a difficoltà a percepirsi come autoregolati, a sottostima delle conseguenze negative dei propri comportamenti, anche quando le capacità cognitive di base lo consentirebbero, e a ricerca di sensazioni forti o gratificazioni subitane. Quando è presente aggressività, questa risulta fortemente sproporzionata rispetto a qualsiasi fattore scatenante. L'espressione, la gestualità e i comportamenti che precedono un impulso denotano attivazione e tensione psichiche, quelli che seguono gli agiti impulsivi denotano sollievo, ma anche imbarazzo, colpa, dispiacere e rimorso. L'impulsività viene concettualizzata anche come sintomo di disturbi neurologici o di altri quadri psicopatologici, come il disturbo da deficit d'attenzione e iperattività, il disturbo bipolare o i disturbi alimentari.